

Total number of pages – 32

CODE : 35T MATH
(EN/AS/BN/BD)

2025

MATHEMATICS

Full Marks : 100

Pass Marks : 30

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Q. No. 1 (a-l) carries 1 mark each (any ten)	$1 \times 10 = 10$
Q. Nos. 2-13 carry 4 marks each.....	$4 \times 12 = 48$
Q. Nos. 14-20 carry 6 marks each.....	$6 \times 7 = 42$
	<hr/>
	Total = 100

Answer the following questions : (any ten)

1×10=10

প্রশ্নাবলির উত্তর দিয়া : (যিকোনো দশটি)

১) প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে-কোনো দশটি)

नि सौनायफोरनि फिननाय हो : (जायखिजाया मोनजि)

Find the number of all one-one functions from set $A = \{1, 2, 3\}$ to $B = \{a, b, c\}$.

সংহতি $A = \{1, 2, 3\}$ ব পরা $B = \{a, b, c\}$ লৈ মুঠ কিমানটা একৈকী ফলন আছে?

সংহতি $A = \{1, 2, 3\}$ -এর মধ্যে $B = \{a, b, c\}$ -তে মোট কতগুলি একৈকী অপেক্ষক আছে।

थुवुर $A = \{1, 2, 3\}$ निफ्राय $B = \{a, b, c\}$ सिम गासै वेसेबां गुदिफा मावथुन दं ?

9) Find the principal value of $\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$.

$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ ব মুখ্য মান নির্ণয় করা।

$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ -এর মুখ্য মান নির্ণয় করো।

$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ नि गाहाइ मान दिहुन।

(c) Let A , B and C are matrices of order $2 \times n$, 3×2 and $2 \times k$ respectively. Then $AB + CB$ will be defined for what values of n and k ?

ধৰাহ'ল A , B আৰু C যথাক্ৰমে $2 \times n$, 3×2 আৰু $2 \times k$ ঘাতৰ মৌলকক্ষ। তেন্তে $AB + CB$ মৌলকক্ষটো n আৰু k ৰ কি মানৰ কাৰণে সংজ্ঞাবদ্ধ হ'ব?

ধৰা হ'ল A , B এবং C যথাক্ৰমে $2 \times n$, 3×2 এবং $2 \times k$ ঘাতের মৌলকক্ষ। তাহলে $AB + CB$ মৌলকক্ষটি n এবং k -এর কোন মানের জন্য সংজ্ঞাবদ্ধ হবে ?

হমৰায় A , B আৰু C ফাৰিই $2 \times n$, 3×2 আৰু $2 \times k$ ফাৰিনি থোঁসাজায়। অল্লা $AB + CB$ থোঁসাজায়া n আৰু k নি মা মাননি থাখ্ৰায় বুঁফোৰথিয়ানি জাগোন ?

(d) State True or False :

Let R be the relation in the set $\{1, 2, 3, 4\}$, given by

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}.$$

Then R is reflexive but not symmetric.

শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা :

$\{1, 2, 3, 4\}$ সংহতিত সংজ্ঞাবদ্ধ সম্বন্ধ R এনেদৰে দিয়া আছে,

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}।$$

তেন্তে R প্রতিফলনীয়, কিন্তু প্রতিসম নহয়।

শুদ্ধ না অশুদ্ধ লেখো :

$\{1, 2, 3, 4\}$ সংহতিতে সংজ্ঞাবদ্ধ সম্বন্ধ R এমনভাবে দেওয়া আছে যে —

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}।$$

তাইলে R প্রতিকলনীয়, কিন্তু প্রতিসম নয়।

থার এয়া নংখায় লির :

$\{1, 2, 3, 4\}$ থুবুরআব বুফোরথিয়ারি সোমোন্দো R এরুবাডি হোনায দ,

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}$$

অব্লা R আ রিফিখাং, নাথায় ফারিগ্ৰোব নডা।

(e) Differentiate e^{x^2+1} with respect to x .

e^{x^2+1} ব x সাপেক্ষে অবকলজ উলিওরা।

e^{x^2+1} -এর x সাপেক্ষে অবকলজ নির্ণয় করো।

e^{x^2+1} নি x লোব্বায়াব সানখি়ি দিহুন।

(f) $\int e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = ?$

(g) Determine the order of the differential equation

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x.$$

$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x$ অবকল সমীকরণের ক্রম নির্ণয় করা।

$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x$ অবকল সমীকরণের ক্রম নির্ণয় করো।

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x \text{ সানখি সমানথাইনি ফারি दिहुन।}$$

(h) For what values of θ , $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$, where θ be the angle between the vectors \vec{a} and \vec{b} ?

θ কি মানক কারণে $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ হয়, ব'ত θ হৈছে ভেক্টর \vec{a} আৰু \vec{b} ক মাজৰ কোণ ?

θ -এর কোন্ মানের জন্য $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ হয়, যেখানে θ হল ভেক্টর \vec{a} এবং \vec{b} -এর মধ্যবর্তী কোণ ?

θ নি মা মাননি থাখায়নো $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ জায়ো, জেরাব θ আ জাদোঁ ভেক্টর \vec{a} আরো \vec{b} নি গেজেরনি খনা ?

(i) A homogeneous differential equation of the form $\frac{dx}{dy} = h\left(\frac{x}{y}\right)$ can be solved by making the substitution—

(A) $y = vx$

(B) $v = yx$

(C) $x = vy$

(D) $x = v$

$\frac{dx}{dy} = h\left(\frac{x}{y}\right)$ আকাৰৰ সমমাত্ৰিক অবকল সমীকৰণ সমাধানৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠাপন সূত্ৰটো

হ'ল—

- (A) $y = vx$
- (B) $v = yx$
- (C) $x = vy$
- (D) $x = v$

$\frac{dx}{dy} = h\left(\frac{x}{y}\right)$ আকাৰৰ সমমাত্ৰিক অবকল সমীকৰণ সমাধানৰ জন্ম প্ৰতিস্থাপন সূত্ৰটি

হ'ল—

- (A) $y = vx$
- (B) $v = yx$
- (C) $x = vy$
- (D) $x = v$

$\frac{dx}{dy} = h\left(\frac{x}{y}\right)$ ম'হৰনি ফোলেৱলি সানখি সমানথাই। মা'বফু'থাইনি থা'খায় ফজ'স্লায়না'য়

মা'বসুলু'আ জা'বায় —

- (A) $y = vx$
- (B) $v = yx$
- (C) $x = vy$
- (D) $x = v$

(j) Find the determinant of the matrix $A = [-3]_{1 \times 1}$.

$A = [-3]_{1 \times 1}$ মৌলিককৰ নিৰ্ণায়ক উলিওৱা।

$A = [-3]_{1 \times 1}$ মৌলিককৰ নিৰ্ণায়ক বের কৰো।

$A = [-3]_{1 \times 1}$ থোঁসাজায়নি দিহুনলি দিহুন।

(k) State True or False :

$\sin x + 100$ is an antiderivative of $\cos x$.

শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা :

$\sin x + 100$ টো $\cos x$ ৰ এটা প্রতি-অবকলজ।

শুদ্ধ না অশুদ্ধ লেখো :

$\sin x + 100$ হল $\cos x$ -এৰ একটি অ্যান্টি-ডেৰিভেটিভ।।

থার एबा नंखाय लिर :

$\sin x + 100$ आ $\cos x$ नि मोनसे सोलायखि उल्था।

(l) Find the direction ratios of the line segment joining the points $(-2, 4, -5)$ and $(1, 2, 3)$.

$(-2, 4, -5)$ আৰু $(1, 2, 3)$ বিন্দু সংযোগী রেখাডালৰ দিশানুপাত উলিওৱা।

$(-2, 4, -5)$ এবং $(1, 2, 3)$ বিন্দু-সংযোগকারী রেখাটির দিশানুপাত নির্ণয় কৰো।

$(-2, 4, -5)$ আরো $(1, 2, 3)$ বিন্দো ফোনাঁজাবনায হাংখানি রুজুজখা থিংজায় দিহুন।

2. Find the simplest form of the function

4

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0.$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0 \text{ ফলনটো সৰলতম আকাৰত প্ৰকাশ কৰা।}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0 \text{ অপেক্ষকটিকে সৰলতম আকাৰে প্ৰকাশ কৰো।}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0 \text{ মাবথুনখৌ গোরলৈসিন মহাব ফোৰমায়।}$$

OR / নহিবা / অথবা / এৰা

$$\text{Find the value of } \tan^{-1}\left(2 \sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right).$$

4

$$\tan^{-1}\left(2 \sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right) \text{ ৰ মান উলিওৰা।}$$

$$\tan^{-1}\left(2 \sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right) \text{-এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।}$$

$$\tan^{-1}\left(2 \sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right) \text{ নি মান দিহুন।}$$

3. Answer (i) and (ii) **or** (a) and (b):
 উত্তর করা (i) আক (ii) অথবা (a) আক (b):
 উত্তর দাও (i) এবং (ii) অথবা (a) এবং (b):
 ফিননায় লির (i) আরো (ii) এবা (a) আরো (b):

(i) If $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, find A^2 .

1

যদি $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, উলিওরা A^2 .

যদি $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ হয়, তাহলে A^2 -এর মান নির্ণয় করো।

যদি $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, দিহুন A^2 .

(ii) If $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, where A' is the transpose of A , then find $(A + 3B)'$.

3

যদি $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ আক $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, য'ত A' টো A ব পক্ষান্তরিত মৌলকক্ষ, তেস্তে $(A + 3B)'$ উলিওরা।

যদি $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, যেখানে A' টি A -এর পক্ষান্তরিত মৌলকক্ষ, তাহলে $(A + 3B)'$ নির্ণয় করো।

যদি $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ আরো $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, জেরাব A' আ A নি দোনস্তায়থাই থাঁসাজায়, অব্লা $(A + 3B)'$ দিহুন।

OR / नईवा / अथवा / एवा

1

(a) Give an example of a skew-symmetric matrix.

बिषम-सममित मूलकम् एटाव उदाहरण दिया।

एकटि बिषम-सममित मूलकम् उदाहरण दाओ।

खैस्लाय फारिग्रोब थोंसाजाय मोनसेनि बिदिन्धि हो।

(b) If $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ and $A + A' = I$, where I is the identity matrix of order 2, then find the value of x .

3

यदि $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ आरु $A + A' = I$, यत् I हैछे 2 घातब अडेद मूलकम्, तेषु x -ब मान उलिओवा।

यदि $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ एवं $A + A' = I$, येखाने I हल 2 घातेर अडेद मूलकम्, तहले x -र मान निर्णय करो।

जुदि $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ आरो $A + A' = I$, जेराव I आ जादों 2 फारिनि थाबिथा थोंसाजाय, अब्ला x -नि मान दिहुन।

4. (i) Using determinants find the equation of the line joining the points (1, 2) and (3, 6).

2

निर्णायक बावहार करि (1, 2) आरु (3, 6) बिन्दु संयोगी रेखाब समीकरण उलिओवा।

निर्णायक बावहार करे (1, 2) एवं (3, 6) बिन्दु-संयोगकारी रेखाब समीकरण निर्णय करो।

दिहुनलि बाहायनाने (1, 2) आरो (3, 6) बिन्दु फोनाजाब हांखोनि समानथाड दिहुन।

- (ii) Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = \sin x$ and $g(x) = x^2$. Then find composition function $g \circ f$.

2

(here \mathbb{R} = set of real numbers)

যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যাতে $f(x) = \sin x$ আৰু $g(x) = x^2$, তেন্তে সংযোজন ফলন $g \circ f$ উলিওৱা। (ইয়াত \mathbb{R} = বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংহতি)

যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এমন যে $f(x) = \sin x$ এবং $g(x) = x^2$, তাহলে সংযোজন অপেক্ষক $g \circ f$ নির্ণয় কৰো। (এখানে \mathbb{R} = বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংহতি)

যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ জাহাথে $f(x) = \sin x$ আরো $g(x) = x^2$, অল্লা জথায় মাৱথুন $g \circ f$ দিহুন। (বেয়াব \mathbb{R} = নংগুৰৈ অনজিমানি থুবুৱ)

5. Find $\frac{dy}{dx}$, if

2+2=4

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

$\frac{dy}{dx}$ উলিওৱা, যদি

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

$\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কৰো, যদি

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

$\frac{dy}{dx}$ दिहून, जुदि

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

6. Find the intervals in which the function f given by
 $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ is

(a) increasing (b) decreasing

2+2=4

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ बद्दबा निदिष्ट f फलनटो कोन अस्तबालत

(a) वर्धमान

(b) ह्रासमान उलिओरा।

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ द्वारा निदिष्ट f अपेक्षकटि कोन अस्तबाले

(a) वर्धमान एवंग

(b) ह्रासमान निर्णय करे।

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ नि जोहै थिखानाय f मावथुना माबे खोन्दोबाव

(a) बालांमान

(b) खमायलांमान दिहून।

OR / नहिवा / अथवा / एवा

A balloon, which always remains spherical, has a variable diameter $(2x + 1)$. Find the rate of change of its volume with respect to x .
4

এটা বেলুন সদায় গোলাকার হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পৰিবৰ্তনশীল ব্যাস $(2x + 1)$ । x সাপেক্ষে ইয়াৰ আয়তনৰ পৰিবৰ্তনৰ হাৰ উলিওৱা।

একটি বেলুন সৰ্বদা গোলাকার হয়ে থাকে এবং এর পৰিবৰ্তনশীল ব্যাস $(2x + 1)$ । x এর সাপেক্ষে এর আয়তনৰ পৰিবৰ্তনৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰো।

थोबसे बेलुना जंब्लाबो दुलुर महर जानाने थायो आरुं चंनि सोलायम्लु खावा $(2x + 1)$ । x नि लोब्जायाव बीन रोजागासैनि सोलायनार्यानि हार दिहुन।

7. Evaluate : (any two)

2+2=4

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

মান নিৰ্ণয় কৰা : (যিকোনো দুটা)

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

মান নিৰ্ণয় কৰো : (যে-কোনো দুটি)

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

मान दिहून : (जायखिजाया मोननै)

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

OR / नहिवा / अथवा / एबा

4

Evaluate :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}$$

मान निर्णय करा :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}$$

मान निर्णय करौ :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}$$

मान दिहून :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} kkk$$

8. Find the area lying in the first quadrant and bounded by the circle $x^2 + y^2 = 1$ and the lines $x = 0$ and $x = 1$. 4

প্রথম চোকত বৃত্ত $x^2 + y^2 = 1$ আৰু সবলৰেখা $x = 0$ আৰু $x = 1$ য়ে আঙৰা ক্ষেত্ৰৰ কালি উলিওৱা।

প্রথম চতুৰ্থাংশ বৃত্ত $x^2 + y^2 = 1$ এবং সরলরেখা $x = 0$ এবং $x = 1$ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত ক্ষেত্ৰৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো।

গিৰি জখ্ৰাইসঁয়াব বেঁখন $x^2 + y^2 = 1$ আৰু গোথোঁহাংখ্ৰো $x = 0$ আৰু $x = 1$ আ আৱগ্ৰিনায় দব্লাইনি দব্লাইথি দিহুন।

OR / নাইবা / অথবা / এৰা

Find the area of the region bounded by the line $y = 3x + 2$, the x -axis and ordinate $x = 1$. 4

$y = 3x + 2$ সবলৰেখা, x -অক্ষ আৰু $x = 1$ কোটিয়ে আঙৰা ক্ষেত্ৰৰ কালি উলিওৱা।

$y = 3x + 2$ সরলরেখা, x -অক্ষ এবং $x = 1$ কোটি দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত ক্ষেত্ৰৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো।

$y = 3x + 2$ গোথোঁহাংখ্ৰো, x -বিধ' আৰু $x = 1$ জানস'আ আৱগ্ৰিনায় দব্লাইনি দব্লাইথি দিহুন।

9. (i) Let \vec{a} is a non-zero vector of magnitude 2 and λ is a non-zero scalar. Find the value of λ such that $\lambda\vec{a}$ is a unit vector. 2

\vec{a} এটা 2 মানৰ অশূনা ভেক্টৰ আৰু λ এটা অশূনা স্কেলাৰ। λ ৰ কি মানৰ বাবে $\lambda\vec{a}$ এটা একক ভেক্টৰ হ'ব?

\vec{a} একটি 2 মানের অশূনা ভেক্টর এবং λ একটি অশূনা স্কেলার। λ -এর কোন মানের জন্য $\lambda\vec{a}$ একটি একক ভেক্টর হবে?

\vec{a} আ মৌনসে 2 মাননি লাথিখ' নডি ভেক্টর আৰু λ আ মৌনসে লাথিখ' নডি স্কেলার। λ নি মা মাননি থাখায় $\lambda\vec{a}$ আ মৌনসে সানগুদি ভেক্টর জাগোন?

(ii) Find the direction cosine of the vector $i + 2j + 3k$.

$i + 2j + 3k$ ভেক্টৰৰ দিশাংক উলিওৱা।

$i + 2j + 3k$ ভেক্টৰেৰ দিশাংক নিৰ্ণয় কৰো।

$i + 2j + 3k$ ভেক্টৰনি থা কসাइन दिह्नु।

10. If a, b, c are unit vectors such that $a + b + c = \vec{0}$, find the value of $a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a$.

4

যদি a, b আৰু c একক ভেক্টৰ হয় যাতে $a + b + c = \vec{0}$, তেন্তে $a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

যদি \vec{a}, \vec{b} এবং \vec{c} একক ভেক্টৰ হয় যাতে $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, তাহলে $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ -এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।

যদি \vec{a}, \vec{b} আৰু \vec{c} সানগুদি ভেক্টৰ জায়ো জাহাথে $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, অল্লা $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ নি মান दिह्नु।

OR / নহিবা / অথবা / एबा

Find the area of a triangle having the points $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ and $C(2, 3, 1)$ as its vertices.

4

এটা ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু তিনিটা $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ আৰু $C(2, 3, 1)$ হলে, ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিওৱা।

একটি ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু তিনিটি $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ এবং $C(2, 3, 1)$ হলে, ত্ৰিভুজটিৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো।

मानसे आख्यानथामानि थिाख्यान विन्दो मानथामा $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ आरु $C(2, 3, 1)$ जायोल्ला आख्यानथामानि दल्लाईथ दिह्नु।

11. (i) Find a vector of magnitude 5 units in the direction of the vector $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$. 2

$\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ ভেক্টৰৰ দিশত এনে এটা ভেক্টৰ উলিওৱা যাৰ মান 5 একক।

$\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ ভেক্টৰেৰ দিশায় এমন একটি ভেক্টৰ নিৰ্ণয় কৰো যাৰ মান 5 একক।

$\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ ভেক্টৰনি দিগাব এঁৰাদি মনসে ভেক্টৰ দিহন জায়নি মানা 5 সানগুদি।

- (ii) Find the projection of the vector $\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ on the vector $7\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$. 2

$7\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$ ভেক্টৰত $\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ ভেক্টৰৰ অভিক্ষেপ নিৰ্ণয় কৰা।

$7\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$ ভেক্টৰেৰ উপৰে $\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ ভেক্টৰেৰ অভিক্ষেপ বের কৰো।

$7\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$ ভেক্টৰত $\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ ভেক্টৰনি থাঁখানায দিহন।

12. (i) A coin is tossed three times. Find the probability of occurring head on the third toss. 2

একটা মুদ্ৰা তিনিবাৰ টছ কৰা হ'ল। তৃতীয় টছত মুণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিওৱা।

একটি মুদ্ৰা তিনিবাৰ টস কৰা হ'ল। তৃতীয় টসটিতে মুণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰো।

গৰসে খাউরি থামখেৰ গাৰহৰনায জাবায। থামখি খেৰ গাৰহৰনাযাব খৰ' মননাযনি জাথাবনা দিহন।

- (ii) Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are spade. 2

52 পতীয়া তাকখেলাৰ থাক এটিৰ পৰা পুনৰ্স্থাপন নকৰাকৈ (without replacement) দুখন পাত যাদৃচ্ছিকভাৱে টনা হ'ল। দুয়োখন পাত ইস্কাপন (spade) হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

52 টি কাৰ্ড সমেত একটি তাসেৰ প্যাকেট থেকে কোনোৱকম বদল না করে দুটি কাৰ্ড এলোমেলোভাৱে টানা হল। উভয় কাৰ্ডেৰ স্পেড (ইস্কাপন) হওয়ার সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰো।

গা 52 বিলাই থানায় জাবসে তাস বিলাইনিফ্রায় জেবো সোলায়া লাসিনো গানৈ বিলাই সায়জ্লে 'জানায় বাদিয়ৈ' বোনায জাবায়। গানৈবো বিলাইয়া ইস্কাপন জানায়নি জাথাবনা দিহন।

3. A man is known to speak truth 4 out of 5 times. He throws a die and reports that it is three. Find the probability that it is actually three. 4

এজন মানুহে 5 বাৰৰ ভিতৰত 4 বাৰ সঁচা কথা কয় বুলি জনা যায়। তেওঁ পাশতি এটা টছ কৰে আৰু তিনি পোৱা বুলি ব্যক্ত কৰে। পাশতিটোত সচাকৈয়ে তিনি পোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

একজন মানুহ 5 বাৰেৰ মধে 4 বাৰ সত্য কথা বলে বলে জনা যায়। তিনি একটি পাশা টস কৰেন এবং 'তিনি' পেয়েছেন বলে জানান। পাশাটিতে সত্যি কৰে 'তিনি' পাওয়ার সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰো।

মাম মানমিয়া 5 খেবনি মাदाव 4 खेब सँथो बाथा बुडो होनना मिथियो। बियो डाइस गरसे टस खालामां आरां थाम मोनबाय होनना फोरमायो। डाइसआव थारैना थाम मोननायनि जाथावना दिहनु।

OR / नहिवा / अथवा / एबा

A fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event 'head appears on the coin' and B be the event '3 on the die'. Check whether A and B are independent events or not. 4

এটা নিৰ্ণীত মুদ্ৰা আৰু এটা অবিপ্লৱিত পাশতি একেলগে টছ কৰা হ'ল। 'মুদ্ৰাটোত মুণ্ড পোৱা ঘটনা'ক A আৰু 'পাশতিটোত 3 পোৱা ঘটনা'ক B ৰে সূচালে, A আৰু B স্বতন্ত্ৰ হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা।

একটা নিখুঁত মুদ্রা এবং একটি অবিকৃত পাশা একসঙ্গে টস্ করা হলো। 'মুদ্রাটিতে মুণ্ড পাওয়া ঘটনা'-কে A এবং 'পাশাটিতে 3 পাওয়ার ঘটনা'-কে B সূচিত করে। A এবং B স্বতন্ত্র কিনা পরীক্ষা করো।

গরসে স্টিমস্টিম খাউরি আরো গরসে রাবনিবো ফারসে জায়ি ডাইস জয়ি গারহরনায় জাভায়। 'খাউরিয়াব খর' মোননায় জাথাইখাঁ A আরো 'ডাইসআব 3 মোননায় জাথাই'খাঁ B জাঁ দিস্থিয়াব্লা। A আরো B আ উদাঁ জাথাই জায়ো না জায়া আনজাদ খালাম।

14. Answer (a) or (b) :

উত্তর কবা (a) আক (b) :

উত্তর দাও (a) অথবা (b) :

ফিননায় লির (a) এন্ডা (b) :

(a) (i) Find the minor and cofactor of the second row and second column element of the determinant 2

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

নির্ণায়কৰ দ্বিতীয় শাৰী আৰু দ্বিতীয় স্তম্ভ মৌলটোৰ অনুৰাশি

আৰু সহৰাশি উলিওৱা।

$$\begin{vmatrix} \bar{2} & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

নির্ণায়কৰ দ্বিতীয় সারি এবং দ্বিতীয় স্তম্ভ মৌলটির অনুৰাশি

এবং সহৰাশি নিৰ্ণয় কৰো।

$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$ दिहुनलिन नैथ लारि आरं नैथ खाम्फा गुदिथा बादियै आरं
 लोगो लारि दिहुन।

(ii) For the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, show that $A^2 - 5A + 7I = 0$.

Hence find A^{-1} , where I is the identity matrix of order 2. 4

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ मौलकम्फर बाबे देखुंरा ये $A^2 - 5A + 7I = 0$ । इयाव
 पबा A^{-1} उलिंवा, य'त I हेछे 2 घातब अंभेद मौलकम्फ।

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ मौलकम्फर केब्रे देखां ये $A^2 - 5A + 7I = 0$ । एर
 थेके A^{-1} निर्णय करे, येखाने I हल 2 घातेर अंभेद मौलकम्फ।

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ थोंसाजायनि थाखाय दिन्थिदि $A^2 - 5A + 7I = 0$ । बेनिफ्राय
 A^{-1} दिहुन, जेराव I आ जादों 2 फारिनि थाविथा थोंसाजाय।

OR / नहिवा / अथवा / एबा

(b) Solve the linear system : (using matrix method)

6

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x - 2y + z = 0$$

बैथिक प्रणालीटो समाधान करा : (मौलकम्फर पद्दतिबे)

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x - 2y + z = 0$$

লৈখিক প্ৰণালীটি সমাধান কৰো : (মৌলিক পদ্ধতি দ্বাৰা)

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x - 2y + z = 0$$

হাংখোআরি বিখান্থিখোঁ মাওফুংথাই দিহুন : (থোঁসাজাযাৰি আদবজোঁ)

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x - 2y + z = 0$$

15. Answer (i) and (ii) or (a) and (b):

উত্তৰ কৰা (i) আৰু (ii) অথবা (a) আৰু (b):

উত্তৰ দাও (i) এবং (ii) অথবা (a) এবং (b):

ফিননায লিৰ (i) আৰু (ii) এৰা (a) আৰু (b):

(i) Find all points of discontinuity of the function f defined by

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{if } x < 1 \\ 0, & \text{if } x = 1 \\ x-2, & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

3

f ফলনৰ বিচ্ছিন্নতাৰ সকলো বিন্দু উলিওৱা য'ত

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{যদি } x < 1 \\ 0, & \text{যদি } x = 1 \\ x-2, & \text{যদি } x > 1 \end{cases}$$

f অপেক্ষকের বিচ্ছিন্নতার সকল বিন্দু নির্ণয় করো যেখানে

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{যদি } x < 1 \\ 0, & \text{যদি } x = 1 \\ x-2, & \text{যদি } x > 1 \end{cases}$$

f মাথনুনি আন্থোর জনায় গাসেবো বিন্দোখৌ দিহুন জেরায

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{জুদি } x < 1 \\ 0, & \text{জুদি } x = 1 \\ x-2, & \text{জুদি } x > 1 \end{cases}$$

(ii) If $\cos y = x \cos(a + y)$, with $\cos a \neq \pm 1$, prove that

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a + y)}{\sin a}$$

3

যদি $\cos y = x \cos(a + y)$, $\cos a \neq \pm 1$, প্রমাণ করা যে,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a + y)}{\sin a}$$

যদি $\cos y = x \cos(a + y)$, $\cos a \neq \pm 1$, প্রমাণ করো যে,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a + y)}{\sin a}$$

জুদি $\cos y = x \cos(a + y)$, $\cos a \neq \pm 1$, ফোরমান খালাম দি,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a + y)}{\sin a}$$

OR / নহিবা / অথবা / एबा

(a) If $y = \sin^{-1} x$, then show that $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} = 0$. 3

যদি $y = \sin^{-1} x$ হয়, তেঁতে দেখুওবা যে $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} = 0$.

যদি $y = \sin^{-1} x$ হয়, তাহলে দেখাও যে $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} = 0$.

জুদি $y = \sin^{-1} x$ জাযো, অল্লা দিন্থি দি $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} = 0$.

(b) Given $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{if } x \leq 3 \\ x+4, & \text{if } x > 3 \end{cases}$

If the function f is continuous at $x=3$, find the value of a . 3

দিয়া আছে $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{যদি } x \leq 3 \\ x+4, & \text{যদি } x > 3 \end{cases}$

যদি f ফলনটো $x=3$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হয়, তেঁতে a ব মান নির্ণয় কবা।

দেওয়া আছে $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{যদি } x \leq 3 \\ x+4, & \text{যদি } x > 3 \end{cases}$

যদি f ফলনটি $x=3$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে a এর মান নির্ণয় কবা।

$$\text{होनाय दं } f(x) = \begin{cases} ax + 1, & \text{जुदि } x \leq 3 \\ x + 4, & \text{जुदि } x > 3 \end{cases}$$

जुदि f मावथुनआ $x = 3$ बिन्दोआव आन्थोजयि जायो, अब्ला a नि मान दिहुन।

16. Find absolute maximum value and absolute minimum value of the function given by

$$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1, \quad x \in [1, 5].$$

6

$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ ब द्वारा निर्दिष्ट f फलनटोब $[1, 5]$ अन्तरालत पबम गरिष्ठ आरू पबम लघिष्ठ मान उलिओवा।

$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ -एर द्वारा निर्दिष्ट f अपेक्षकटिब $[1, 5]$ अन्तराले परम गरिष्ठ एवं परम लघिष्ठ मान निर्णय करो।

$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ नि जोहै थि f मावथुननि $[1, 5]$ आन्थोराव बासिनथा देरमा आरो हायसिनथा देरमा मान दिहुन।

OR / नहिवा / अथवा / एबा

Find the point(s) on the curve $x^2 = 2y$ which is nearest to the point $(0, 3)$. <https://www.assamboard.com>

6

$(0, 3)$ बिन्दुटोब पवा निम्नतम दूरद्वत $x^2 = 2y$ बक्रटोब ओपबत थका बिन्दु/बिन्दुबोब उलिओवा।

$(0, 3)$ बिन्दुटि थेके निम्नतम दूरद्वे $x^2 = 2y$ बक्रटिब उपरे अवस्थित बिन्दु/बिन्दुगुलि निर्णय करो।

$(0, 3)$ बिन्दोनिफ्राय खाथिसिन जानथाइयाव $x^2 = 2y$ बोहांखोनि सायाव थानाय बिन्दो/बिन्दोफोरखौ दिहुन।

17. Evaluate : (any one)

(i) $\int \sqrt{\tan x} dx$

(ii) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx$

মান নির্ণয় করা : (যিকোনো এটা)

(i) $\int \sqrt{\tan x} dx$

(ii) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx$

মান নির্ণয় করো : (যে-কোনো একটি)

(i) $\int \sqrt{\tan x} dx$

(ii) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx$

मान दिहून : (जायखिजाया मोनसे)

(i) $\int \sqrt{\tan x} dx$

(ii) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx$

✓ 18. Solve the following differential equations : (any two)

3+3=6

(i) $x(x-1)\frac{dy}{dx} = 1, \quad y(-1) = 0$

(ii) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$

(iii) $(x-y)dy - (x+y)dx = 0$

তলৰ অৱকল সমীকৰণকেইটা সমাধান কৰা : (যিকোনো দুটা)

(i) $x(x-1)\frac{dy}{dx} = 1, \quad y(-1) = 0$

(ii) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$

(iii) $(x-y)dy - (x+y)dx = 0$

নীচৰ অৱকল সমীকৰণগুলি সমাধান কৰা : (যে-কোনো দুটি)

(i) $x(x-1)\frac{dy}{dx} = 1, \quad y(-1) = 0$

(ii) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$

(iii) $(x-y)dy - (x+y)dx = 0$

गाह्यरानि सानखि समानथाइफोरखीं मावफुंथाइ खालाम : (जायखिजाया मोननै)

(i) $x(x-1)\frac{dy}{dx} = 1, \quad y(-1) = 0$

(ii) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$

(iii) $(x-y)dy - (x+y)dx = 0$

19. Answer (a) or (b) :

उत्तर कला (a) आरु (b) :

उत्तर दाओ (a) अथवा (b) :

फिननाय लिर (a) एबा (b) :

(a) (i) If the lines

$$\frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2} \quad \text{and} \quad \frac{x-1}{3k} = \frac{y-1}{1} = \frac{6-z}{5}$$

are perpendicular, find the value of k .

3

यदि $\frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2}$ रेखाडाल $\frac{x-1}{3k} = \frac{y-1}{1} = \frac{6-z}{5}$ रेखाडालन लम्ब हय, k व मान उलिओवा।

यदि $\frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2}$ रेखाटि $\frac{x-1}{3k} = \frac{y-1}{1} = \frac{6-z}{5}$ रेखाटिर लम्ब हय, k एव मान निर्णय करो।

जुदि $\frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2}$ हांग्वा आ $\frac{x-1}{3k} = \frac{y-1}{1} = \frac{6-z}{5}$ हांग्वांनि थोंगेर जायो, अरु k नि मान दिहुन।

(ii) Find the Cartesian equation of the line through the point (5, 2, -4) and which is parallel to the vector $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$. 3

(5, 2, -4) বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ ভেক্টৰৰ সমান্তৰাল ৰেখাডালৰ কাৰ্টেজীয় সমীকৰণ উলিওৱা।

(5, 2, -4) বিন্দুৰ মধ্য দিয়ে অতিক্ৰান্ত $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ ভেক্টৰৰ সমান্তৰাল ৰেখাটিৰ কাৰ্টেজীয় সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰো।

(5, 2, -4) বিন্দুনি গেজৰজোঁ থানাৰ $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ ভেক্টৰনি লিগ হাংখোনি কাৰ্টেজীয় (সমানথালয়াৰি) সমানথাই দিহুন।

OR / নাইবা / অথবা / এৰা

(b) Find the shortest distance between the lines

$$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2} \text{ and } \frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}.$$

6

$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2}$ আৰু $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}$ ৰেখা দুডালৰ মাজৰ ন্যূনতম দূৰত্ব উলিওৱা।

$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2}$ এৰু $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}$ ৰেখা দুটিৰ মধ্যবৰ্তী ন্যূনতম দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰো।

$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2}$ আৰু $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}$ হাংখো দোঁনোনি গেজৰনি সুঁসিন জানথাই দিহুন।

graphically the following linear programming problems
Maximize and minimize $Z = 3x + 5y$
subject to the constraints

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

6

$Z = 3x + 5y$ ব সর্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন মান উলিওৱা
যত

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

$Z = 3x + 5y$ -এৰ সর্বোচ্চ এবং সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ণয় কৰো
যেখানে

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

$Z = 3x + 5y$ নি বাঁসিনথা আৰু হায়সিনথা মান দিহুন

জেৱাব

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

OR / নাহিবা / অথবা / एवा

Determine graphically the minimum value of the objective function $Z = 3x + 9y$ subject to the constraints

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

6

উদ্দিষ্ট ফলন

$Z = 3x + 9y$ ৰ সৰ্বনিম্ন মান উলিওৱা, য'ত x আৰু y ৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ হ'ল

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

উদ্দিষ্ট অপেক্ষক

$Z = 3x + 9y$ -এৰ সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ণয় কৰো, যেখানে x এবং y -এৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ হ'ল

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

श्रांखुथा ढावथुन

$Z = 3x + 9y$ नि हायसिनथा ढान दिहुन, जेराव x आरो y नि हेंथायफोरा जाबाय —

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

— x —